

СЕЛЬСКИЙ ЛИСТОКЪ.

ВЫХОДИТЬ
ДВА РАЗА
ВЪ МѢСЯЦЪ.

№ 10 1862.

ЦѢНА
ЗА 24 ЛИСТА
ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: о спѣлости и уборкѣ хозяйственныхъ растений.—объ углубленіи почвы.—употребленіе катка.—предосторожности при кровопусканіи.—два средства въ болѣзняхъ животныхъ.

О СПѢЛОСТИ И УБОРКѢ ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ РАСТЕНІЙ.

Спѣлость и зрѣлость растенія вещи совершенно различныя; ихъ не надо смѣшивать между собою. Собственно одни только сѣмена созрѣваютъ, то есть дѣлаются способными давать ростокъ, изъ котораго развивается цѣлое новое растеніе; такъ какъ сѣмя заключается въ плодѣ, то говорятъ, что плодъ созрѣлъ, когда собственно сѣмя созрѣло. Поспѣть же можетъ растеніе и тогда, когда сѣмя еще не зрѣло, но та часть растенія, для которой собственно оно воздѣлывается, стала годною къ употребленію. Нѣкоторыя растенія воздѣлываемъ мы ради сѣмянъ, иныя для стеблей, третьи—для листьевъ; потому и при уборкѣ *прежде всего нужно смотреть на спѣлость тѣхъ частей растенія, для которыхъ мы его воздѣлываемъ.* Растенія салатныя, капустныя, щавель, шпинатъ, лукъ-сѣянецъ, огуречная трава, шелковица, дрокъ и нѣкоторыя другія красильныя растенія воздѣлываются для листьевъ; потому и убирать эти растенія должно тогда, когда листья ихъ начнутъ достигать настоящей своей величины. Если же мы соберемъ ихъ раньше этого времени, то сборъ нашъ будетъ

далеко меньше, и кромѣ того собранное не будетъ имѣть надлежащаго вида, вкуса и запаха; такія же неудобства встрѣтятся намъ при позднемъ сборѣ. Другія растенія воздѣлываются для листьевъ и стеблей, какъ, на примѣръ, всѣ луговые травы; по этому, ихъ надо убирать въ то время, когда стебель достигнетъ полной величины; и начнутъ раскрываться первые цвѣточки. Это самое лучшее время для сѣнокоса, потому что ранѣе—получится сѣна меньше, а позже сѣно худшее. Впрочемъ, такая уборка хороша только тогда, когда на лугахъ растутъ многолѣтнія травы, которыя располагаются отъ корней, на примѣръ тимофеевка, бѣлая дятлина и проч. Если же тутъ растенія однолѣтнія, на примѣръ, горошекъ и другія съ цвѣточками, бѣлыми, синими, красными, то косить ихъ нужно, когда большая часть цвѣточковъ уже распустилась, чтобы при сущеніи сѣна они успѣли повысыпаться нѣсколько сѣмянъ для будущаго урожая. Нѣкоторыя растенія, какъ, на примѣръ, мята, укропъ, и вообще большая часть пахучихъ растеній, также иныя красильныя, какъ, на примѣръ, желтѣяница, воздѣлываются для стеблей, листьевъ и цвѣтовъ; по этому, ихъ надо убирать въ ту пору, когда большая часть цвѣтовъ раскроется,

неожидая полного цвѣтенія всѣхъ растений. Медоносныя растенія, какъ, напримѣръ, сныть, сѣтся для цвѣтовъ, которыхъ не собираютъ, а предоставляютъ въ пользованіе пчелъ. Въ этомъ случаѣ отъ хозяина требуется только, чтобы онъ сѣялъ эти растенія въ-время; они должны развѣстись къ тому времени, когда пчелы нуждаются въ сборѣ; такъ какъ въ тоже время скашиваютъ луговые травы, то надо стараться, чтобы медоносныя растенія цвѣли до самой той поры, когда пчелы начинаютъ вылетать изъ ульевъ. Вообще, на сѣверѣ Россіи для сбора однихъ цвѣтовъ не выращиваютъ растений; на югѣ же Россіи воздѣлываются и такія растенія, напримѣръ, шафранъ, сафлоръ. Цвѣты съ нихъ собираются поодиночкѣ, въ то время, какъ они совсѣмъ распускаются. Одними стеблями мы пользуемся отъ многихъ растений, напримѣръ, отъ всего строеваго, дроваго и подѣлочнаго лѣса; къ рубкѣ деревъ надо приступать тогда, когда стебель достигнетъ спѣлости, то есть сдѣлается годнымъ на извѣстное употребленіе; но не раньше и не позже этого срока. Многія растенія воздѣлываемъ мы для однихъ корней, напримѣръ, рѣдись, рѣдку, свеклу, морковь, цикорій, марену, хрѣнь; поэтому и убирать ихъ надо въ то время, когда корень сдѣлается годнымъ къ употребленію, а это бываетъ не у всѣхъ растений въ одно время. Однолѣтнія, какъ рѣдись, слѣдуетъ убирать немедленно, послѣ того, какъ корень получить достаточную величину; иначе они дадутъ цвѣточные стебли и корень сдѣлается негоднымъ къ употребленію. У двулѣтнихъ, каковы—морковь, свекла, рѣдка,

корень поспѣваетъ только въ концѣ перваго лѣта; тогда и слѣдуетъ ихъ убирать. У многолѣтнихъ, какъ у хрѣна, корень поспѣваетъ не раньше конца втораго лѣта послѣ посадки; въ это время начинаютъ и вырѣзывать его. Также точно поступаютъ и съ тѣми растеніями, которыя воздѣлываются для листьевъ и корня, напримѣръ, корневая петрушка. Иныя растенія воздѣлываются только для корневыхъ шишекъ, которыя дѣлаются годными къ употребленію гораздо раньше созрѣванія сѣмянъ, какъ мы видимъ это на картофелѣ; по этому, и не ожидаютъ этого созрѣванія, а выкапываютъ картофельныя шишки, когда онѣ достаточно выростутъ и начинаютъ сами отпадать отъ корней. Большая часть полевыхъ растений воздѣлывается собственно для зерна, а потому убирать ихъ нужно въ то время, когда зерно созрѣетъ. У насъ часто даютъ хлѣбнымъ растеніямъ переставаться на корню; отъ этого очень много зерна осыпается и мука выходитъ чернѣе и въ меньшемъ количествѣ противъ того, какъ если бы хлѣбъ убирали во-время. Жатву колосовыхъ хлѣбныхъ растений должно начинать въ то время, когда стебель у земли пожелтѣетъ, нижніе листики завянутъ, зерно сдѣлается совершенно полнымъ и такъ окрѣпнетъ, что при давленіи между пальцами не оставляетъ ни малѣйшей влажности, хотя бы колосъ былъ и зеленоватъ. Убранный въ такое время хлѣбъ совершенно дозрѣетъ уже въ снопахъ. Нѣкоторыя растенія, напримѣръ, ленъ и конопля, воздѣлываются у насъ для сѣмянъ и стеблей; таскать ихъ нужно въ то время, когда сѣмена начинаютъ созрѣ-

вать, но не должно откладывать это до совершенной зрѣлости сѣмянъ, потому что въ такомъ случаѣ волокно сдѣлалось бы очень грубымъ. Впрочемъ, никогда нельзя достигнуть того, что одинъ и тотъ же лёнъ далъ и отличныя сѣмена и прекрасное волокно, а всегда выходитъ, что если получится хорошее волокно, то сѣмена выходятъ плохія, тощія, или сѣмена отличныя, а волокно плохое, грубое, или наконецъ, и то и другое ни худо, ни хорошо. По этому, въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ Ярославской губерніи, гдѣ лёнъ воздѣлывается для полученія самаго толкаго волокна, годнаго на высшаго сорта пряжу, его высѣвають очень часто и начинаютъ таскать съ полюсъ, какъ только стебель достигнетъ совершенной своей длины, не дожидаясь зрѣлости сѣмянъ. А въ тѣхъ мѣстахъ Новороссійскаго края, гдѣ лёнъ воздѣлывается только для сѣмянъ, высѣвають его рѣдко и начинаютъ косить только тогда, когда уже сѣмена совершенно созрѣютъ.

При уборкѣ хозяйственныхъ растений, *надобно также смотреть на то, куда и на что хотятъ употребить эти растенія*, потому что одно и тоже растеніе, смотря по различному его употребленію, должно снимать въ разное время. Если хотятъ употреблять горохъ въ щи или соусъ, то стручки снимаютъ такъ рано, что не даютъ сѣменамъ и подроствѣ, а если изъ него хотятъ приготовить зеленый горошекъ, то стручки обрываютъ въ ту пору, когда сѣмена уже совсѣмъ выростутъ, хотя они бываютъ въ это время еще мягки и зелены; если же горохъ готовить на сѣмена, то ожидаютъ ихъ полной зрѣлости. Если бываетъ

сельскій листокъ 1862 года.

запросъ на капусту, свеклу, морковь, когда они еще не поспѣли, тогда не выгодно ихъ снимать очень рано, потому что мы можемъ продать ихъ за хорошую цѣну. Но эти самыя растенія, для храненія ихъ въ прокъ (на зиму, или до будущаго сбора), убираются только тогда, когда они достигнутъ полной спѣлости, такъ какъ въ этомъ видѣ они лучше сохраняются. Ихъ держать по этому на грядкахъ до тѣхъ поръ, пока не настанетъ время морозовъ, а капустѣ даютъ даже простоять немного и подъ морозомъ, отъ чего кочаны дѣлаются крѣпче.

Имѣя въ виду сохраненіе впрокъ, или сушеніе, плодовъ, ягодъ садовыхъ и лѣсныхъ, мы должны употреблять ихъ совершенно зрѣлыми; въ такомъ же видѣ употребляются плоды и на пастилу. Душистыя травы снимаются на сушеніе также въ то время, когда достигнутъ полной спѣлости. Но вишня, малина, клубника, крыжовникъ и др. ягоды на варенье идутъ не совсѣмъ зрѣлыми, для того, чтобы они лучше сохраняли свой видъ и не разсыпались при кипяченіи. Грецкій орѣхъ на варенье идетъ даже совсѣмъ зеленымъ. Приготовленіе зеленого горошка и турецкихъ бобовъ занимаетъ средину между сушеніемъ и вареньемъ, такъ что плоды ихъ берутся не совсѣмъ зрѣлые, почти зеленые. На маринованіе также употребляютъ плоды самыя молодыя; ягоды: бруснику, клюкву, морошку мочатъ не совсѣмъ зрѣлыми; но когда бруснику, вмѣсто воды, заливаютъ морсомъ изъ той же ягоды, то на морсъ лучше брать совершенно зрѣлую ягоду. Также и на соленье употребляются плоды не зрѣлые, напримеръ, огурцы; въ такомъ видѣ они крѣпче и

*

вкуснѣе. Для квашенія капусты и свеклы, лучше брать ихъ совсѣмъ спѣлыми, какими они дѣлаются въ началѣ осени. Грибы же вообще для всякаго приготовленія: варенья, жаренья, отвариванія, сушенія, маринованья и соленья предпочитаютъ молодые; не надобно, впрочемъ, пренебрегать и взрослыми, если они совершенно здоровы; старые же, дряблые и червивые не годятся ни на какое употребленіе.

Случается иногда, что хозяинъ, волею или неволею, принужденъ убирать свое растеніе раньше того, какъ онъ располагалъ. Если, напримеръ, дождемъ или градомъ такъ сильно пришибетъ ленъ къ землѣ, что онъ совсѣмъ поляжетъ и можетъ загнить, то благоразумнѣе убрать его поскорѣе, хотя бы онъ и не достигъ еще полного возраста. Убранный въ такое время зеленый ленъ даетъ мало волокна, но волокно выйдетъ прекрасное. Иногда на капусту въ такомъ множествѣ нападаетъ капустный червь, что отъ него никакъ нельзя избавиться; если не собрать въ это время капусты, то она все равно пропадетъ. На лѣсныя дачи нападаютъ иногда въ огромномъ количествѣ черви и гусеницы; хорошіе лѣсоводы, замѣтивъ такое несчастье, вырубаютъ тогда лѣсъ цѣлыми участками, чтобы спасти только отъ червей остальное. Картофельная болѣзнь, памятная не одному хозяину, заставляетъ иногда выкапывать картофель раньше времени ихъ спѣлости. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на пшеницу и ячмень сильно нападаютъ птицы: когда защищать отъ нихъ трудно, а нападенія замѣтно опустошительны, то лучше всего потопиться уборкою. Морозы вредны для многихъ

растеній, какъ то: для овса, свеклы, картофеля, моркови и другихъ; по этому, при ранней наступленіи морозовъ, надо также спѣшить ихъ уборкою. Много есть и другихъ обстоятельствъ, заставляющихъ хозяевъ приступать къ уборкѣ растеній раньше надлежащаго срока.

Всѣ растенія, воздѣлываемыя для полученія отъ нихъ сѣмянъ на будущій посѣвъ, или на другое какое нибудь употребленіе, должны быть оставляемы на корню до послѣдней ихъ зрѣлости, потому что только зрѣлая сѣмена могутъ дать хорошіе всходы и крѣпкія растенія; зрѣлая сѣмена льна, мака, конопли, даютъ болѣе масла, чѣмъ не зрѣлая; также точно зрѣлая сѣмена тмина, укропа, аниса и др. душистѣе и вкуснѣе не зрѣлыхъ. По этому, сѣменнымъ яблокамъ и грушамъ даютъ висѣть на деревѣ до тѣхъ поръ, пока они сами не свалятся; сѣменные огурцы оставляютъ на грядкахъ, пока они не сдѣлаются мягкими и негодными въ пищу; бобы и горохъ получаютъ совершенную зрѣлость только тогда, когда стручки ихъ засохнутъ, а сѣмена достигнутъ настоящей величины, отвердѣютъ и примутъ свойственный имъ цвѣтъ; макъ и ленъ оставляются на корню, пока головки не засохнутъ и сѣмена не станутъ бряцать при трясеніи головокъ. Но часто сѣмена какого нибудь растенія не всѣ созрѣваютъ одновременно. Хлѣбныя колосовыя растенія, у которыхъ почти всѣ сѣмена поспѣваютъ разомъ въ одно время, можно и убирать всѣ вдругъ; но бываютъ и другія растенія, на которыхъ въ одномъ плодѣ сѣмена уже созрѣли, тогда какъ другой плодъ только еще завязывается, а третій и не завязывается, а еще цвѣтетъ; сюда отно-

сятся садовые плоды, ягоды, огурцы, бобы, горохъ и проч. Одни изъ такихъ плодовъ, на- примѣръ, огурцы, яблоки убираются по одиночкѣ, по мѣрѣ созрѣванія сѣмянъ; другія же убираются всѣ вдругъ, на примѣръ, горохъ, бобы, въ то время, когда большая часть ихъ созрѣетъ, но никогда не дожидаются зрѣлости всѣхъ вообще сѣмянъ, иначе будетъ очень много потери. У гороха при сухой и теплой погодѣ, послѣ дождей, стручки раскрываются и сѣмена выпадаютъ. У многихъ растений въ одномъ и томъ же плодѣ не всѣ сѣмена вдругъ созрѣваютъ; въ такомъ случаѣ, если можно, какъ, на примѣръ, у мака плауна, выбираютъ изъ плода одни зрѣлыя сѣмена, а не зрѣлымъ даютъ дозрѣвать; если же нельзя этого сдѣлать безъ поврежденія самаго плода, то убираютъ его въ ту пору, когда большая часть сѣмянъ созрѣла. Впослѣдствіи, уже вѣяніемъ и просѣваніемъ отдѣляютъ зрѣлыя сѣмена отъ незрѣлыхъ. Вообще выгоды для хозяйства убирать сѣмена немного недозрѣлыми, чѣмъ давать имъ переставаться и перезрѣвать, потому что не совершенно зрѣлыя могутъ дозрѣть въ снопахъ, въ пучкахъ, или въ самыхъ плодахъ. Только въ томъ случаѣ можно посовѣтовать уборку совершенно зрѣлыхъ сѣмянъ, когда думаютъ хранить ихъ долгое время, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, потому что зрѣлыя сѣмена вообще лучше сохраняются и менѣе боятся поврежденій.

ОБЪ УГЛУБЛЕНІИ ПОЧВЫ.

Извѣстно, что чѣмъ глубже верхній обработанный пластъ земли, тѣмъ лучше могутъ рас-

пространяться внизъ корни растений, которыя находятъ тогда болѣе пищи и менѣе подвергаются вліянію быстрыхъ переѣнъ погоды, тепла и холода. Глубокая почва не такъ скоро нагрѣвается и не такъ скоро остываетъ: въ мокрую погоду менѣе страдаетъ отъ излишества влаги, а въ сухую—отъ засухи. Если почва сама по себѣ глубока, то ее прямо можно пахать на желаемую глубину, лишь бы пригодны были на то земледѣльческіе, пахатные снаряды, т. е. плугъ, соха или косуля. Если же почва мелка, то углублять ее нужно не вдругъ, а постепенно, по одному изъ двухъ слѣдующихъ способовъ:

1. Разрыхляютъ подпочву, материкъ, но не выворачиваютъ ее наверхъ. Это дѣлается такимъ образомъ, что при паханіи за плугомъ или сохою заставляютъ идти другую соху только безъ палицы. Эта послѣдняя соха разрыхляетъ, рѣжетъ землю въ бороздѣ, но не подымаетъ и не выворачиваетъ ее наверхъ. Въ слѣдствіе такого разрыхленія вода просасывается сверху въ подпочву и избавляетъ почву отъ излишней влажности; въ тоже время эта вода уноситъ изъ почвы въ подпочву часть навоза и другихъ питательныхъ частицъ, вслѣдствіе чего удобряется по немногу и подпочва; такому превращенію материка въ пахатный слой помогаетъ и вліяніе воздуха, который свободно проникаетъ на глубину подпочвы.

2. Другой способъ состоитъ въ томъ, что передъ каждымъ посѣвомъ углубляютъ пашню, захватывая немного, хотя на одну четверть (вершка), самаго материка. Такимъ образомъ, въ продол-

женіе нѣсколькихъ лѣтъ, можно углубить папню до надлежащей степени. Само собою разумѣется, что вновь захватываемая земля должна быть тщательно переѣшиваема съ землею, удобренною или обработанною, и что, по мѣрѣ углубленія нашего пласта, намъ необходимо увеличивать и количество навоза на прежній участокъ.

УПОТРЕБЛЕНІЕ КАТКА.

У насъ мало употребляется катокъ и въ земледѣльческомъ быту нашемъ, онъ почти неизвѣстенъ, между тѣмъ вещь эта очень простая и полезная для земледѣльца. Катокъ дѣлается деревянный, круглый, какъ барабанъ, иногда и пустой, какъ барабанъ, а иногда цѣльный изъ толстаго бревна въ родѣ кругляка, на которомъ мясники разрубаютъ мясо. На обоихъ концахъ катка укрѣпляются веретена, представляющія его неподвижную ось; къ нимъ придѣлывается обоймица съ дышломъ или оглоблями, къ которымъ припрягается рабочій скотъ. Цѣльный катокъ, разумѣется, тяжелѣе пустаго, и дѣйствіе его бываетъ сильнѣе; кромѣ того, чѣмъ короче и толще катокъ, тѣмъ сильнѣе его дѣйствіе. Обыкновенно катки дѣлаются отъ половины до аршина въ поперечникѣ и въ полтора, два, три аршина длиною. Катки употребляются для придавливанія и для уплотненія земель рыхлыхъ, чтобы сохранить въ нихъ влажность; для раздробленія глинистыхъ глыбъ, которыя въ иныхъ мѣстахъ разбиваютъ деревянными колотушками, что гораздо тяжелѣе и дороже; глыбы эти, не разбиваемыя бороною,

легко укатываются подъ каткомъ. Далѣе, онъ употребляется для мелкой покрывки сѣмянъ землею и, наконецъ, для придавливанія къ землѣ корней озимаго хлѣба, которые весною отъ мороза иногда выступаютъ на поверхность. Укатываніе должно производить не въ мокрую погоду, потому что мокрая земля прилипаетъ къ катку и тѣмъ замедляетъ работу; притомъ, если катокъ плотно прижметъ поверхность почвы, то онъ затруднитъ всходы растений и въ такомъ случаѣ причинитъ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Каткомъ въ два аршина длиною можно укатать въ день полторы и даже двѣ десятины.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КРОВОПУСКАНІИ.

Въ прستمъ быту кровопусканіе составляетъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ лекарствъ; къ нему охотно прибѣгаетъ и больной и деревенскій лекаръ или фельдшеръ: оба вѣрують, что кровопусканіе всегда и во всякой болѣзни полезно, и что послѣ него точно рукой сниметъ всякой недугъ. А между тѣмъ кровопусканіе — одно изъ самыхъ сильныхъ средствъ, которымъ должно пользоваться съ большою осторожностью. Есть случаи, когда оно полезно и даже необходимо; еще чаще можно обойтись вовсе безъ кровопусканія, а во многихъ случаяхъ оно положительно вредно. Мы приведемъ здѣсь нѣкоторыя примѣты, которыми каждый можетъ руководствоваться при опредѣленіи пользы или вреда отъ кровопусканія.

Нельзя обойтись безъ того, чтобы не пустить кровь, когда съ полнокровнымъ человѣкомъ слу-

чился ударъ (апоплексія). Здѣсь нельзя терять ни минуты, потому что кровопусканіе—почти единственное средство сохранить больному жизнь. Въ случаяхъ сильнаго внутренняго воспаления или горячки, когда всѣ средства оказываются безсильными, кровопусканіе можетъ помочь и ослабить болѣзнь, а иногда и совершенно ее уничтожить. Весьма важно также предупредить воспаленіе, когда какое нибудь сильное и внезапное пораженіе въ тѣлѣ, нарушаетъ правильность кровообращенія, на примѣръ, при жестокихъ ранахъ, ушибахъ, паденіи съ большой высоты, жестокомъ кашлѣ у беременной женщины и тому подобныхъ потрясеніяхъ; въ этихъ случаяхъ кровь сильно приливаетъ къ одному мѣсту и легко производитъ въ немъ воспаленіе, если не удалить избытокъ ея кровопусканіемъ. Нужно также наблюдать за комплекціею больного и его образомъ жизни: если у него короткая шея, и при сильно-питательной, сытной пищѣ, онъ дѣлаетъ мало движенія, то своевременное кровопусканіе можетъ предотвратить ударъ; нѣтъ сомнѣнія, что избѣжать его можно также и перемѣною образа жизни, воздержаніемъ отъ горячительныхъ напитковъ, отъ исключительно мясной пищи, ежедневнымъ движеніемъ и соблюденіемъ умеренности въ снѣ, пищѣ, и всякихъ напряженіяхъ тѣла, или ума. Но къ такому самообладанію не всѣ способны: повторяющіеся приливы къ головѣ, неровные сны, то длинные, то короткіе, безпокойство, біеніе сердца, и временами вялость всего организма, указываютъ на необходимость кровопусканія. Вообще, людямъ полнокровнымъ, у которыхъ голова кружится въ

теплой комнатѣ, или послѣ сильнаго движенія, или при нагибаніи и быстромъ поднятіи головы, кровопусканіе никогда не вредно. Полнокровіе узнается часто по густой краскѣ въ лицѣ, а также и по другимъ признакамъ: когда, на примѣръ, вдругъ по всему тѣлу, безъ всякой видимой причины, разливается сильная теплота, или въ теплой комнатѣ ощущается сильный зудъ по всему тѣлу. Полезно также кровопусканіе, когда у больного развилась какая нибудь болѣзнь собственно отъ того, что у него остановились обычныя, или правильныя кровоистеченія, къ которымъ уже привыкъ его организмъ, на примѣръ, послѣ остановки у женщинъ—мѣсячныхъ очищеній, а у мужчинъ—геморроидальныхъ кровоистеченій; но здѣсь кровопусканіе хотя и не повредитъ, но часто можетъ быть замѣнено другими средствами, по указанію врача.

Можно сказать, что оно крайне необходимо только въ необыкновенныхъ случаяхъ жизни, какъ то въ ударѣ, сильномъ ушибѣ, паденіи, сильномъ внутреннемъ воспаленіи, жестокой ранѣ и тому подобныхъ происшествіяхъ.

Въ болѣе легкихъ болѣзняхъ, кровопусканіе хотя и помогаетъ, но приноситъ вмѣстѣ съ тѣмъ неудобство, потому что мало по малу приучаетъ организмъ къ потерѣ крови въ извѣстные сроки. Когда приходится открывать кровь, то никогда не должно пускать ее болѣе трехъ чайныхъ чашекъ за однимъ разомъ. Гораздо лучше повторить кровопусканіе потомъ еще нѣсколько разъ, чѣмъ одновременно обезсилить больного большою потерею крови. При этомъ замѣчено, что слабымъ людямъ лучше открывать

кровь лежачимъ, а если случится съ ними обморокъ, то впустить къ нимъ свѣжаго воздуха, и вспыснуть холодною водою.

Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо убавить кровь больному, а открыть ее некому, можно воспользоваться пиявками; тогда ихъ приставляютъ къ затылку, или къ поясницѣ, разомъ штукъ пятнадцать, и перемѣняютъ ихъ почаще, чтобы они высосали побольше крови.

Теперь мы сообщимъ тѣ случаи, когда кровопусканіе не только бесполезно, но даже вредно. Прежде всего это относится къ больнымъ, которые страдаютъ малокровіемъ, худосочиемъ и изнуреніемъ силъ; они обыкновенно имѣютъ блѣдный или блѣдно-синій цвѣтъ лица, тусклую кожу и глаза, не исправный аппетитъ, и т. д. Вредно открывать кровь людямъ, разслабленнымъ болѣзнями, или разными излишествами, пораженнымъ наружными сыпями, гнилою горячкою, расстройствомъ желудка (отъ чего вырабатывается мало крови) подверженнымъ: спазмамъ, разнымъ припадкамъ, отъ которыхъ является печальное настроеніе духа (ипохондрія), падучей болѣзни, истерикѣ. Никогда не слѣдуетъ открывать крови ни старикамъ, ни дѣтямъ, ни лицамъ слабаго сложенія, ни такимъ больнымъ, которые страдаютъ другими необыкновенными испражненіями: постоянною рвотою, поносомъ, или кровотечениями. Вредно кровопусканіе также для такихъ людей, у которыхъ конечности тѣла, руки и ноги часто бываютъ холодны и отекаютъ, и для больныхъ, стра-

дающихъ завалами и разными затвердѣлостями, которыя мѣшаютъ правильному обращенію крови.

Вообще же, безъ совѣта опытнаго врача, къ кровопусканію лучше прибѣгать только въ особенныхъ, крайнихъ, случаяхъ, когда жизнь человѣка находится въ опасности, и открываніе крови составляетъ единственное средство спасти ее; во всѣхъ другихъ случаяхъ перемѣна образа жизни, пищи и питья, свѣжій воздухъ, купанья, умѣренныя движенія и труды, могутъ часто съ успѣхомъ замѣнить это сильное средство, или отдалить его необходимость на значительное время.

ДВА СРЕДСТВА ВЪ БОЛѢЗНЯХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

Телята часто подвергаются мыту (поносу); въ этомъ случаѣ всего лучше помогаетъ слѣдующее средство: надо сварить супъ изъ крупы называемой *саю*, и этого супа давать два раза въ день по чайной чашкѣ, до тѣхъ поръ, пока поносъ прекратится.

Часто коровы съ большимъ трудомъ разрѣшаются отъ бремени. Чтобы помочь имъ въ подобныхъ родахъ, нерѣдко сопряженныхъ съ опасностью жизни, имъ даютъ перезжеиаго ржанаго солода, разведеннаго водою. Жидкую кашницу эту вливаютъ прямо изъ бутылки въ ротъ, пока припадки уменьшаются.