

СЕЛЬСКИЙ ЛИСТОКЪ.

ВЫХОДИТЬ

ДВА РАЗА

ВЪ МѢСЯЦЪ.

№ 13 1862.

ЦѢНА

ЗА 24 ЛИСТА

ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: ЗАМѢТКИ ДЛЯ УБОРКИ РЖИ. — НАСТАВЛЕНІЯ КЪ ЛУЧШЕМУ СБЕРЕЖЕНІЮ ХЛѢБА ВЪ СНОПАХЪ. — КАКЪ УЗНАВАТЬ МОЛОЧНОСТЬ КОРОВЫ. — ВРЕДЪ ОТЪ ХОЛОДНАГО ПИТЬЯ ВЪ ЖАРКОЕ ВРЕМЯ. — ОБМАЗКА ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНІЯ СОЛОМЕННЫХЪ КРЫШЪ ОТЪ ДОЖДА И ОГНЯ. — ОБЩЕДОСТУПНОЕ СРЕДСТВО УНИЧТОЖАТЬ ЗЛОВОНІЯ. — О КОЛИЧЕСТВѢ ПТУХОВЪ, НУЖНЫХЪ ВЪ ХОЗЯЙСТВѢ. — ПРИГОТОВЛЕНІЕ ВКУСНОЙ ОВСЯНОЙ КРУПЫ. — ЛЕГКІЙ СПОСОБЪ УЗНАВАТЬ МАТКУ ВЪ ПЧЕЛИНОМЪ РОЗЪ.

ЗАМѢТКИ ДЛЯ УБОРКИ РЖИ.

На уборку хлѣбовъ должно обращать большое вниманіе; важнѣе всего, чтобы сдѣлать эту уборку въ свое время. Хлѣба вообще скоро поспѣваютъ одинъ за другимъ, а если опустить нѣсколько дней, то они легко переспѣваютъ и начинаютъ осыпаться. Сколько при этомъ бываетъ потери, можетъ понять всякій хозяинъ, когда онъ вспомнитъ, что зерно сыпется при жатвѣ или косьбѣ, при складываніи въ крестцы или копны, при перевозкѣ на токъ или гумно, и при укладкѣ въ скирды. По этому, благоразумные хозяева предпочитаютъ начинать жатву хлѣба нѣсколько раньше того времени, какъ онъ поспѣлъ; надо только, чтобы зерно довольно окрѣпло и солома была довольно суха; тогда снопы не сгорятъ въ крестцѣ (или копнѣ) и дозрѣетъ при хорошей погодѣ въ нѣсколько дней. Само собою разумѣется, что жатву надо начинать съ возвышенныхъ, солнечныхъ мѣстъ, гдѣ хлѣбъ спѣлѣе.

Вообще, опытные люди совѣтуютъ убирать рожь за недѣлю до того времени, какъ она совершенно поспѣетъ, то есть въ то время, когда зерна еще мягки и зеленовато-желтаго цвѣта.

Но на всякій случай, чтобы сырое зерно не подвергнулось порчѣ въ копнахъ, снопы сжатой ржи ставятъ колосьями вверхъ въ небольшія кучки, называемыя бабками, въ которыхъ при хорошей погодѣ зерна дозрѣваютъ очень скоро.

Этотъ способъ представляетъ много выгодъ въ хозяйствѣ. Во-первыхъ, заблаговременная уборка ржи, поспѣвающей ранѣе другихъ хлѣбовъ, даетъ много времени для успѣшной уборки и прочихъ поспѣвающихъ, какія находятся въ полѣ; не надо торопиться и искать много рабочихъ, и всю работу можно дѣлать исподволь, отчетливо. Во-вторыхъ, изъ такой не вполне дозрѣвшей ржи почти вовсе не осыпается зерно при уборкѣ, а потому хозяинъ можетъ рассчитывать на значительное сбереженіе сѣмянъ. Въ-третьихъ, зерна недозрѣвшей ржи, окончательно вызрѣвающія въ крестцахъ и копнахъ на солнцѣ, получаютъ гораздо полнѣе и тяжелѣе, чѣмъ зерна, вполне созрѣвшія на корню; мука изъ нихъ выходитъ бѣлая, питательная, здоровая, даетъ много припека и, безъ примѣси пшеничной муки, доставляетъ очень вкусный, почти бѣлый хлѣбъ, который не подвергается червоточенію. Худшія свойства зеренъ, убранныхъ при полной зрѣлости ржи, происхо-

дятъ отъ того, что большая часть ихъ или перерѣла уже на самомъ корню, или перерѣвается при уборкѣ и сушкѣ, а въ этотъ состояніи они представляются жесткими, деревянистыми, съ толстою кожею, и при размолѣ, даютъ твердую муку, въ которой много непитательныхъ веществъ; отъ того приготовляемый изъ нея хлѣбъ выходитъ грубымъ, невкуснымъ. Напротивъ, и не вполне зрѣлыя зерна, поспѣвая при уборкѣ, дѣлаются мучнистыми, тонкокожими, и доставляютъ превосходную муку. Нѣкоторые хозяева, однакоже, возражали противъ такого способа уборки ржи, говоря будто не дозрѣвшее на корню зерно не можетъ идти на посѣвы. Но это оказалось несправедливымъ: такія сѣмена даютъ превосходные всходы, которые поспѣваютъ нѣсколькими днями раньше, чѣмъ всходы изъ перерѣвшихъ зеренъ.

НАСТАВЛЕНІЯ КЪ ЛУЧШЕМУ СБЕРЕЖЕНІЮ ХЛѢБА ВЪ СНОПАХЪ.

Во многихъ мѣстахъ, особенно откуда далеко сбывать хлѣбъ, часто волей-неволей, при недостаткѣ рабочихъ, приходится сберегать хлѣбъ въ снопахъ довольно долгое время. Въ этомъ случаѣ необходимо защитить эти снопы отъ мышей, отъ сырости и отъ разбрасыванія вѣтромъ, о чемъ мы и скажемъ ниже. Когда мы научимся надежно складывать хлѣбъ въ снопахъ, тогда мы приобрѣтемъ много выгодъ. Во-первыхъ, мы можемъ обходиться безъ закрома для зерна и, стало быть, избавить себя отъ издержекъ на ихъ постройку; далѣе, мы избавляемся отъ лиш-

нихъ издержекъ, которыя тратятся при спѣшной молотбѣ сыромолотнаго хлѣба, въ то время, когда наемъ рабочихъ бываетъ еще дорогъ, по лѣтнимъ почти цѣнамъ. Въ сельскомъ быту менѣе вѣроятностей, что украдутъ хлѣбъ въ снопахъ, чѣмъ въ зернѣ, потому что это труднѣе, хлопотнѣе, да и хлѣба меньше унесутъ въ снопахъ, чѣмъ въ зернѣ. Важно также то, что для крестьянина сноповый хлѣбъ надежнѣе, чѣмъ молоченный, потому что онъ не такъ легко сбываетъ его сосѣду, или шинкарю, для доставленія себѣ лишняго рубля на попойку, или въ случаѣ семейнаго праздника какого нибудь.

Далѣе, хорошо сложенные хлѣбныя скирды или одонья вовсе не портятся мышами и переносятъ всякую непогоду, въ теченіе многихъ лѣтъ. Это особенно важно для тѣхъ изъ нашихъ мѣстностей, въ которыхъ, кромѣ частыхъ неурожаевъ, являются еще различные враги хлѣбамъ: саранча, суслики, жучки и тому подобныя.

И такъ, есть много выгодъ держать хлѣбъ въ снопахъ не молоченымъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ особенности же тамъ, гдѣ мѣста для сбыта хлѣба находятся далеко, и гдѣ хозяева не обладаютъ лишними деньгами въ рабочую пору, для скорѣйшаго вымолота и продажи хлѣба. Но какъ же надо складывать для этого хлѣбъ? Всякій хозяинъ, конечно, знаетъ обыкновенный способъ складыванія сноповъ въ одонья и скирды. Снопъ, перевязанный соломенной веревкой (свясломъ) представляетъ два конца: тотъ, который состоитъ изъ колосьевъ, называется *воломъ*, а другой, — изъ концовъ срѣзанной соломы — *комель*. Когда снопъ еще свѣжъ,

тогда волоть шире, чѣмъ комель, такъ что въ свѣжемъ снопѣ, лежащемъ на землѣ, часть съ колосьями бываетъ выше, чѣмъ нижняя часть, кончающаяся соломой. Но когда снопъ просохнетъ, завянетъ и облежится, тогда волоть (конецъ съ колосьями) становится ниже комеля (конца соломеннаго). По этому, когда складываютъ снопы въ скирды или одонья и кладутъ снопы ровно, комелями (соломою) наружу, а колосьями внутрь, то съ теченіемъ времени середина скирды сѣдается, и въ ней дѣлается какъ бы впадина; въ тоже время комели немного приподнимаются, и вся скирда немного раздается, расширяется. Такимъ образомъ, при обыкновенной укладкѣ сноповъ, мы получаемъ такую скирду, которая легко поддается сырости и порчѣ и въ то же время очень удобно населяется мышами. Падающій дождь и сырость легко проходятъ по соломѣ внизъ, къ самой внутренности скирды, такъ какъ комели приподнялись вверхъ, отъ сѣданія колосевъ; съ другой стороны мыши, которыя завелись въ землѣ подъ хлѣбомъ, легко проникаютъ въ скирду и устраиваютъ тамъ свои постоянныя жилища; имъ потому удобно въ такой скирдѣ, что въ срединѣ ниже, чѣмъ по краямъ скирды, и они легко могутъ расхаживать по ней, не опасаясь соскользнуть, упасть на землю, или быть захваченными какою нибудь хищною птицею.

Къ этимъ неудобствамъ обыкновенной кладки присоединяется еще и то, что часто для хлѣбныхъ скирдъ выбираютъ не совсѣмъ чистыя и твердо-утопанные мѣста и покрываютъ ихъ не свѣжею, гнилою соломой, на которую на-

брасываютъ уже снопы. Все это только увеличиваетъ удобства для размноженія въ скирдахъ мышей. Часто склады хлѣба покрываютъ въ видѣ крыши сѣномъ, или соломой, или снопами хлѣба, надѣясь тѣмъ сберечь остальные снопы отъ сырости и дождя; и дѣйствительно, это сохраняетъ часть хлѣба отъ порчи, особенно при хлѣбной же покрывкѣ. Но за то, при такой крышѣ, мыши размножаются еще лучше, ибо они также защищаются ею отъ дождя. Кромѣ того, различный соръ, навозъ и нечистоты, накопляющіеся между скирдами и неочищаемые въ свое время, также весьма помогаютъ мышамъ дѣлать ходы подъ землею изъ одной скирды въ другую, такъ что когда разбираютъ одну скирду, то мыши переселяются въ другую.

И такъ, ясно, что обыкновенная укладка сноповъ не позволитъ намъ долго сохранять хлѣбъ отъ порчи. Надо сдѣлать эту укладку такъ, чтобы съ сноповъ легко стекали дождевыя капли внизъ, на землю (а не во внутренность скирды), и чтобы мышамъ не было удобно распложаться въ хлѣбѣ.

Для этого надо озаботиться: 1) чтобы комели по краямъ скирды лежали ниже, чѣмъ колосья во внутренности скирды, 2) чтобы возлѣ скирдъ соблюдалась возможная чистота и 3) чтобы земля, на которой стоитъ скирда, была неудобна для мышиныхъ норъ.

Для того, чтобы наружная солома сноповъ была наклонена внизъ, такъ чтобы отъ середины скирды къ краямъ образовался скатъ, нужно укладывать снопы особеннымъ образомъ. Землю, назначенную подъ скирду, сперва хорошенько

убиваютъ; или уколачиваютъ колотушками; у кого есть лишнее время и деньги, тотъ съ большою пользою могъ бы уложить мѣсто камнями, или кирпичами, или даже сдѣлать родъ фундамента съ гладкими стѣнками. Такое приготовленіе земли подъ скирдою мѣшаетъ переходу сырости съ почвы въ хлѣбъ, и не позволяетъ заводиться тамъ мышамъ. Если же нѣтъ средствъ для каменнаго фундамента, то просто убиваютъ плотно землю и накладываютъ на ней по краямъ будущей скирды, снопы, сдѣланные изъ колючихъ растений, напримѣръ, репейника, колючаго бурьяна, и т. п. Этими же растеніями выкладываютъ и весь низъ скирды. Такимъ образомъ мы защищаемъ наши снопы отъ мышей. Далѣе производятъ самую кладку сноповъ: сначала укладываютъ ихъ на низу по краямъ, какъ обыкновенно, соломой наружу, а колосьями внутрь; потомъ постилаютъ болѣе къ срединѣ, такъ чтобы середина постоянно была выше краевъ. Такимъ образомъ продолжаютъ кладку и на верху дѣлаютъ крышу уступами, настилая снопы довольно круто, въ прислонку одинъ къ другому, чтобы они лучше держались, втыкаютъ соломенные (нижніе) концы ихъ въ нижніе снопы и покрываютъ, наконецъ, послѣдніе снопы какъ обыкновенно. Такъ какъ концы съ колосьями ссѣдаются отъ времени, то эту укладку надо дѣлать очень плотно и такъ, чтобы, и по осѣданіи концовъ съ колосьями, середина скирды все-таки была выше краевъ и имѣла бы къ нимъ покатость. Тогда падающія капли дождя будутъ скользить по соломѣ, какъ по чешуѣ, и падать внизъ, на землю; мышамъ также не-

удобно будетъ ходить между снопами, потому что онѣ подвергаются опасности окатиться съ краю и упасть на землю.

При всемъ этомъ, необходимо еще соблюдать постоянную чистоту между скирдами, очищая отъ туда всякій соръ и нечистоты; полезно также выбрать такое мѣсто для гумна, при которомъ оно провѣвается вѣтрами со всѣхъ сторонъ.

Если мы исполнимъ всѣ эти предосторожности, то нашъ хлѣбъ въ снопахъ, какъ показали опыты, можетъ простоять безъ всякой порчи десять и болѣе лѣтъ.

КАКЪ УЗНАВАТЬ МОЛОЧНОСТЬ КОРОВЫ.

При покупкѣ коровы, очень важно знать: въ какой степени она молочна, т. е. много ли она даетъ молока, и хорошее ли это молоко?

Качество молока можно опредѣлить, подоивши ее и испытавши его на вкусъ, а также давши ему отстояться; тогда по количеству и вкусу слѣдуетъ судить о самомъ молокѣ. Такимъ же испытаніемъ въ продолженіи нѣсколькихъ дней можно опредѣлить и количество даваемого коровою молока. Но подобныя пробы не всегда вѣрны, потому что онѣ зависятъ отъ различныхъ обстоятельствъ, какъ, напримѣръ, отъ качества и количества корма, отъ времени года, отъ способа ея содержанія, и тому подобное. Гораздо важнѣе опредѣлить породу коровы и разные признаки, отъ которыхъ зависитъ большая или меньшая степень ея молочности.

У насъ встрѣчаются очень рѣдко иностран- ные породы коровъ; большей частью въ хозяй- ствахъ бываютъ наши русскія коровы, съ не- большими рогами, загнутыми вѣнчикомъ, съ не- большимъ бочкообразнымъ туловищемъ, разду- тымъ брюхомъ, впалымъ подлѣ бедръ. Всякая иностранная порода легко отличается отъ на- шей русской; наприимѣръ, тирольская корова бы- ваетъ обыкновенно темнокрасной масти, съ тол- стымъ туловищемъ на короткихъ ногахъ, съ приподнятымъ задомъ, короткою, но широкою головою и широкими плечами. Швейцарскія ко- ровы отчасти похожи на тирольскихъ по ши- ринѣ головы, плечъ и туловища, но бываютъ кромѣ темныхъ и пестрыхъ мастей; съ ними схожи и нѣкоторыя нѣмецкія породы. Голланд- скія коровы самыя крупныя въ свѣтѣ, съ узкою головою, короткими впередъ торчащими рогами и большимъ туловищемъ, пестрой масти, боль- шею частью бѣлой съ черными пятнами. Онѣ даютъ очень много молока; но оно водя- нисто; самое жирное молоко у породъ гор- ныхъ. Венгерскія коровы даютъ также жирное молоко, но очень мало. Холмогорская порода наша происходитъ отъ голландской, отличается крупностью и молочностью.

Во всякой породѣ, однакоже, встрѣчаются ко- ровы съ различною степенью молочности, а по- тому важно знать признаки, по которымъ можно судить о молочности покупаемой коровы. У той ко- ровы, которая даетъ больше молока, обыкновенно задняя часть туловища развита болѣе, чѣмъ пе- редняя, т. е. къ задѣ оно шире и больше, отъ чего брюхо кажется отвислымъ; грудь бываетъ

узкая, сжатая съ боковъ, и не выдается впе- редъ; бока малые, не выпуклые. У хорошихъ молочныхъ коровъ голова представляется легкою небольшою, какъ будто сплюснутою съ обѣихъ сторонъ; рога тонкіе, хвостъ длинный и тонкій, крестецъ низкій, короткий; кожа и волоса мягкіе, нѣжные; ноги тонкія; вообще весь видъ—жен- ственный.

Этотъ общій осмотръ важнѣе всего при оцѣнкѣ коровы и всегда даетъ наилучшее средство опредѣлить ея молочность. Но есть еще и другіе признаки, которые могутъ помочь при оцѣнкѣ молочности коровы; между ними обращаетъ на себя особенное вниманіе такъ называемое *мо- лочное зеркало*, или *щитокъ*. Если рассматри- вать внимательно шерсть коровы на заднихъ но- гахъ надъ выменемъ, по направленію къ началу хвоста, то мы легко отличимъ мѣста, въ кото- рыхъ шерсть идетъ не внизъ, какъ на ляшкахъ и на прочемъ туловищѣ, а—вверхъ. Эти-то мѣста и называются зеркаломъ. Замѣчено, что чѣмъ шире и больше это зеркало, тѣмъ молочнѣе ко- рова. Самое лучшее зеркало широко растилается по обѣимъ ляшкамъ и широкою полосою до- ходитъ до самаго корня хвоста; часто оно бы- ваетъ широко только внизу, а къ верху идетъ одною или двумя узкими полосами; вообще чѣмъ шире оно къ низу, тѣмъ лучше. Самый худшій признакъ, если зеркало очень мало и слабо замѣтно. Небольшія, не правильно распадающія полоски зеркала, при жесткихъ волосахъ, осо- бенно на вымени, указываютъ также на плохую молочность. Напротивъ, въ числѣ хорошихъ признаковъ считаютъ то, если на вымени нѣтъ

твердыхъ и жесткихъ волосъ и если кожа вымени мягкая; это вмѣстѣ указываетъ и на хорошее качество молока. Если мы замѣтимъ по обѣимъ сторонамъ задняго прохода узкія полоски съ жесткою шерстью вверхъ, то это дурной признакъ; но при хорошемъ зеркалѣ на не него можно не обращать вниманія.

И такъ, величина и видъ зеркала у коровъ даетъ намъ средство судить о ея молочности; но не должно полагаться на одинъ этотъ признакъ. Надо непременно сдѣлать общій осмотръ коровы и судить о ея молочности на основаніи всѣхъ изложенныхъ примѣтъ вмѣстѣ, а не придавать вѣса какой либо одной изъ нихъ. Если есть возможность узнать матку покупаемой коровы и вообще качества ея предковъ, то это весьма облегчитъ нашу оцѣнку.

При этомъ надо замѣтить, что возрастъ коровы оказываетъ большое вліяніе на количество удоя; только послѣ третьяго отела, корова начинаетъ давать все то количество молока, которое она способна дать; это продолжается до седьмаго или восьмаго теленка, стало быть, до десятаго или двѣнадцатаго года; за тѣмъ количество молока начинаетъ уменьшаться, послѣ cadaго новаго отела. Хорошій, сытный кормъ, спокойствіе, кроткое обхожденіе, правильное доеаніе увеличиваютъ количество молока у коровы; но оно само собою уменьшается въ жаркую пору и въ сильные холода, а также отъ рѣзкихъ вѣтровъ. Выгоднѣе также, чтобы корова теллилась весною или въ началѣ лѣта, чѣмъ осенью, потому что тогда она скоро поступаетъ на зеленый кормъ и даетъ больше молока, чѣмъ та,

которая приближается къ отеленію въ тоже самое время.

Но корова не доится круглый годъ; обыкновенно принимаютъ, что въ теченіе года хорошая корова не должна оставаться безъ удоя долѣ двухъ мѣсяцевъ. Если ей даютъ хорошій кормъ, то на каждые 100 фунтовъ сѣна (или другаго корма, равнаго по питательности сѣну, она должна давать, среднимъ числомъ, до 36 фунтовъ (или $13\frac{1}{2}$ кружекъ молока, при ежегодномъ отелѣ. Но это количество молока даютъ только хорошія породы, при хорошемъ содержаніи. Вообще же, трудно опредѣлить, сколько молока можетъ дать корова въ годъ, не зная ея породы и содержанія. Разница въ этомъ отношеніи бываетъ такъ велика, что одна корова даетъ въ годъ 2500 кружекъ, а другая всего 600 и даже менѣе.

ВРЕДЪ ОТЪ ХОЛОДНАГО ПИТЬЯ ВЪ ЖАРКОЕ ВРЕМЯ.

Лѣтомъ очень часто приходится работникамъ, работающимъ въ полѣ, косарямъ, жнецамъ, грабарямъ и вообще всѣмъ лицамъ, подвергающимся жарѣ—испытывать сильную жажду. Если при этомъ съ жадностью пить холодную воду, то легко можно получить опасную болѣзнь. Весьма не рѣдки примѣры, что люди, бывшіе въ сильной испаринѣ и выпившіе холодной воды, получали чахотку, другіе воспаленіе въ желудкѣ, водяную болѣзнь и умирали, не смотря ни на какую медицинскую помощь. Обыкновенно, послѣ такой простуды холоднымъ питьемъ, замѣчается у больнаго головная боль, лихорадочный

ознобъ, безпокойство, слабость, рвота, иногда поносъ, припадки въ родѣ холерныхъ, иногда столь внезапные, что казалось, будто напитокъ былъ отравленъ. Но иногда припадки отъ простуды холоднымъ питьемъ обнаруживаются не скоро, такъ что трудно и догадаться о первоначальной причинѣ болѣзни.

Если у простуженнаго появилась только боль въ головѣ и въ желудкѣ, то ему можно помочь, давая пить теплый настой липы, ромашки, чаю и т. п.; но если въ то же время показался поносъ, рвота и острые боли въ желудкѣ, то надо всячески стараться возстановить пріостановленную испарину; для этого окутываютъ больного теплыми шерстяными одѣялами, трутъ его тѣло теплыми полотенцами и въ то же время даютъ ему пить горячій, сильный настой цвѣтовъ бузины. Если припадки, уменьшившіеся на время, затѣмъ опять возобновляются съ большей силой, потомъ опять исчезаютъ и опять возобновляются, то въ этихъ случаяхъ надо поскорѣе обращаться къ совѣту врача, потому что болѣзнь можетъ принять опасный оборотъ.

Вообще, самое лучшее, что можно посовѣтывать противъ простуды холоднымъ питьемъ, это — не пить скоро и съ жадностью, когда человекъ чувствуетъ себя въ разгоряченномъ состояніи. Если жажда очень велика, то надо пить воду медленно мелкими глотками и, нагрѣвъ ее во рту, пропускать теплою въ желудокъ. Когда случится утолять жажду натошакъ, то лучше передъ питьемъ съѣсть немного хлѣба, или сахара. Притомъ человекъ, находящійся въ испаринѣ, послѣ питья, долженъ опять приниматься

за работу, или дѣлать движеніе, чтобы избѣжать простуды.

ОБМАЗКА ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНІЯ СОЛОМЕННЫХЪ КРЫШЪ ОТЪ ДОЖДЯ И ОГНЯ.

Такую обмазку дѣлаютъ слѣдующимъ образомъ: берутъ жирной глины, песка, конскаго навоза и немного извести и дѣлаютъ тѣсто, перемѣшивая весломъ эту смѣсь съ колодезною или рѣчною водою, такъ чтобы она оставалась густою. За тѣмъ накладываютъ ее на соломенную крышу, съ помощію лопаты, употребляемыхъ штукатурами, или другими какими либо инструментами, не болѣе какъ на полъ-пальца толщиною. За тѣмъ даютъ обмазкѣ просохнуть, отъ чего въ ней дѣлаются мѣстами трещины, и снова покрываютъ ее новымъ слоемъ обмазки. Въ Малороссіи кладутъ эту обмазку послойно съ соломой. Если и за тѣмъ появятся еще трещины, при высыханіи крыши, то ихъ примазываютъ тѣмъ же самымъ тѣстомъ, разведеннымъ водою пожиже, или размокшимъ землянымъ кирпичемъ.

ОБЩЕДОСТУПНОЕ СРЕДСТВО УНИЧТОЖАТЬ ЗЛОВОНІЯ.

Въ сельскомъ быту встрѣчаются иногда занятія, сопряженныя съ отдѣленіемъ дурнаго запаха, хотя и гораздо рѣже, чѣмъ въ фабричномъ быту. Теперь найдено простое средство уничтожать зловоніе въ комнатахъ, магазинахъ, хлѣвахъ, на фабрикахъ, словомъ, гдѣ угодно. Берутъ обыкновеннаго алебастра (гипса), пережженного и толченаго; къ нему прибавляютъ

немного дегтя, получаемого при перегонкѣ каменнаго угля; въ случаѣ надобности, можно взять и обыкновеннаго дегтя, выбирая такой, который имѣетъ довольно сильный, острый запахъ. Эту смѣсь алебастра съ дегтемъ прикладываютъ къ тѣлу или вещи, издающей дурной запахъ, отъ чего онъ вскорѣ прекращается. Можно прикладывать ее также къ ранамъ и порѣзамъ, которыя эта смѣсь лишаетъ дурнаго запаха и вмѣстѣ стягиваетъ; но въ этомъ случаѣ, для удобнѣйшаго прикладыванія смѣси, ее разводятъ деревяннымъ масломъ и дѣлаютъ тѣсто, въ родѣ пластыря.

О КОЛИЧЕСТВѢ ПѢТУХОВЪ, НУЖНЫХЪ ВЪ ХОЗЯЙСТВѢ.

Часто спрашиваютъ: сколько куръ можно назначить на одного пѣтуха? Этотъ вопросъ разрѣшается различно, смотря потому, для какой цѣли содержатся куры. Если исключительно только для несенія яицъ, то одного пѣтуха достаточно для двадцати четырехъ куръ; если же мы разводимъ цыплятъ, то имѣя въ виду крѣпкихъ здоровыхъ цыплятъ, мы должны ограничить кругъ дѣятельности одного пѣтуха не болѣе какъ 6, или 8-ю курами. Замѣчено также, что пѣтухъ можетъ обнаруживать свою производительную способность до 50 разъ въ день. Опытные хозяева совѣтуютъ не держать куръ болѣе трехъ лѣтъ, если они не представляютъ особенно цѣнной породы; по этому, ежегодно третью часть куръ надо возобновлять. Чтобы имѣть при этомъ здоровыхъ цыплятъ для замѣны ста-

рыхъ, совѣтуютъ заключать цѣтуха съ нѣсколькими курами въ отдѣльныя загородки, а не оставлять его на полной свободѣ.

ПРИГОТОВЛЕНІЕ ВКУСНОЙ ОВСЯНОЙ КРУПЫ.

Овесъ насыпаютъ въ котелъ и, слегка смочивъ его водою, разводятъ подъ котломъ легкій огонь; потомъ втыкаютъ въ овесъ до самого дна чистую бѣлую палку и оставляютъ ее стоять, нисколько не помѣшивая ею овса. Временами вынимаютъ эту палку, а когда замѣтятъ, что она сдѣлалась совершенно суха, тогда вынимаютъ овесъ изъ котла, потому что онъ поспѣлъ. За тѣмъ кладутъ его въ истопленную, теплую печь на цѣлыя сутки, закрывъ отверстіе печи заслонкою; отъ этого овесъ высыхаетъ и немного подгораетъ; тогда его пускаютъ подъ жернова, и легкимъ давленіемъ сдираютъ съ зеренъ лузгу, потомъ провѣиваютъ ихъ, для отдѣленія лузги, и превращаютъ, какъ обыкновенно, въ крупу, которая выходитъ безъ всякой клейкости, очень вкусная и въ то же время питательная.

ЛЕГКІЙ СПОСОБЪ УЗНАВАТЬ МАТКУ ВЪ ПЧЕЛИНОМЪ РОѢ.

Выходящій пчелиный рой сажаютъ въ новый улей; часто случается, что при этомъ не замѣчаютъ присутствія матки. Чтобы убѣдиться въ томъ, что она дѣйствительно находится въ новомъ роѣ, надо въ темную ночь освѣтить внутренность улья маленькой восковой свѣчкой, и тогда матка первая вылѣзаетъ на свѣтъ и легко можетъ быть узнана по своему наружному виду.