СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 10. ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

1860. ЦѢНА ЗА 24 ЛИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: О СБЕРЕЖЕНІИ КАРТОФЕЛЯ. — ПРИЗНАКИ ЛОШАДИНЫХЪ ЛѢТЪ ПО ЗУБАМЪ. — МѢРЫ ПРОТИВЪ СКОТСКИХЪ ПАДЕЖЕЙ.

О СБЕРЕЖЕНІИ КАРТОФЕЛЯ.

Умѣнье сберегать на зиму клубни корнеплодныхъ растеній, какъ напримѣръ: картофеля, рѣпы и свеклы, очень важно для земледѣльца. Что ему пользы въ обильномъ урожаѣ, если собранное добро испортится и пропадетъ отъ неумѣнья обращаться съ нимъ. Не пропали ли тогда даромъ и всѣ труды и старанія, употребленные имъ на обработку поля, на уходъ за растеніями и на собираніе плодовъ? Съ грустью глядитъ онъ на испорченные запасы, пропавшіе, можетъ быть, по его же собственной винѣ, и со страхомъ ожидаетъ будущаго, которое угрожаетъ ему и скоту недостаткомъ самаго необходимаго. А между тѣмъ предупредить это горе и убытки вовсе не такъ трудно, какъ многимъ кажется. Посмотримъ же, какъ нужно поступать при сбереженіи картофеля. Въ небольшихъ хозяйствахъ сохраняютъ картофель чаще всего въ погребахъ и подвалахъ, но и тамъ онъ легко можетъ попортиться, если не будутъ соблюдены нѣкоторыя предосторожности. Вырытые изъ земли клубни, которыхъ никогда не слѣдуетъ копать въ сырую погоду, должно разложить на нѣсколько времени, прежде складки въ подвалъ, не слишкомъ толстымъ слоемъ въ прохладномъ мѣстѣ, на открытомъ воздухѣ или въ сараѣ, для того, чтобы они могли хорошенько просохнуть или выпотѣть. По прошествіи или двухъ, или трехъ недѣль, когда картофель совершенно просохъ, отбираютъ больные или порченные клубни и складываютъ его въ подвалъ. У кого нѣтъ мѣста для просушки картофеля послѣ его уборки съ поля, тотъ долженъ покрайней мѣрѣ складыватъ ихъ въ подвалъ не разомъ, но всегда съ нѣкоторыми промежутками. Прежде складки картофеля въ погреба, ихъ слѣдуетъ очистить отъ земли и ростковъ, оставшихся въ нихъ отъ хранившихся тамъ прежде клубней, потомъ хорошенько провѣтрить, сжечь въ подвалахъ солому или выкурить можжевельникомъ, для того чтобы выгнать гнилыя испаренія и освѣжить воздухъ.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Самый подвалъ или погребъ долженъ быть совершенно сухъ, потому что сырость и мокрота — главныя причины гніенія картофеля. Для этого необходимо устроивать погреба на совершенно сухой почвѣ и хорошенько убить или, что еще лучше, вымостить полъ. Они должны быть защищены отъ холода, но и не слишкомъ теплы; чѣмъ глубже подвалъ, тѣмъ онъ безопаснѣе отъ морозовъ. Въ стѣнахъ должны быть сдѣланы продушины для того, чтобы во внутренность могъ всегда проникать свѣжій воздухъ; во время сильныхъ морозовъ эти продушины запираются какъ можно плотнѣе крышками или затыкаются соломою или конскимъ навозомъ. Самый подвалъ или погребъ долженъ быть достаточно просторенъ, такъ чтобы испаренія, выходящія изъ клубней, могли удобно уходить къ верху. Картофель слѣдуетъ складывать слоемъ не выше трехъ аршинъ и оставлять въ срединѣ свободную дорогу, отъ которой должны идти къ стѣнамъ на извѣстномъ разстояніи проходы; такимъ образомъ въ погребу будетъ нѣсколько кучь или отдѣленій, къ которымъ можно будетъ подходить для осмотра ихъ съ трехъ сторонъ. По складкѣ клубней, должно въ первые дни держать двери и отдушины въ подвалахъ отворенными до наступленія морозовъ. Зимою въ теплую погоду и въ полдень въ солнечные дни продушины открываются для того, чтобы испаренія могли выходить вонъ. Въ началѣ весны картофель начинаетъ обыкновенно пускать ростки, а иногда и загнивать. Для предупрежденія проростанія нужно въ эту пору чаще провѣтривать подвалы и раскладывать клубни возможно тонкимъ слоемъ, загнившіе же отбирать. Особенное вниманіе слѣдуетъ обращать на картофель, назначенный для посадки; такіе клубни должно, при мало-мальски благопріятной погодѣ, раскладывать въ прохладномъ мѣстѣ и держать ихъ тамъ въ теченіи нѣсколькихъ недѣль предъ посадкою; они пускаютъ тогда менѣе ростковъ и слегка завядаютъ, отъ чего ускоряется впослѣдствіи ихъ всходъ.

Но такъ какъ въ обыкновенныхъ погребахъ и подвалахъ, даже и при соблюденіи всѣхъ исчисленныхъ предосторожностей, картофель не всегда сохраняется долго безъ порчи, то хорошіе хозяева употребляютъ для этой цѣли еще слѣдующія средства: на полу погреба насыпаютъ торфяной или каменноугольной золы и кладутъ на эту постилку слой картофельныхъ клубней толщиною въ аршинъ, на который снова насыпаютъ золы, а потомъ опять картофеля. Когда куча уже достаточно высока, тогда ее покрываютъ толстымъ слоемъ золы, который вполнѣ предохраняетъ клубни отъ сырости и мороза. Промежутки между стѣнами и картофелемъ также наполняются, для защиты отъ холода, золою. Вмѣсто торфяной золы, можно также брать сухой песокъ; но онъ хуже втягиваетъ въ себя сырость, выходящую изъ клубней. Сберегаемый по этому способу картофель остается совершенно здоровъ, не загниваетъ, не пускаетъ ростковъ и хорошо держится до новаго сбора. Другое также очень хорошее, хотя и нѣсколько дорогое средство, состоитъ въ томъ, что въ подвалѣ, на высотѣ осьми вершковъ отъ полу, устроиваютъ родъ подмостокъ изъ брусьевъ, прибит-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

тыхъ къ перекладинамъ на такомъ разстояніи одинъ отъ другаго, чтобы клубни средней величины не могли проваливаться внизъ. На такія подмостки можно насыпать картофель безъ вреда слоемъ въ полтора до двухъ аршинъ; онъ сберегается на нихъ очень хорошо, потому что совершенно просыхаетъ вскорѣ послѣ складки въ погребъ. Разумѣется, что и при употребленіи этихъ средствъ, необходимо наблюдать, чтобы погребъ былъ хорошо вычищенъ и чтобы свѣжій воздухъ имѣлъ въ него свободный доступъ.

Картофельные клубни можно также сберегать въ подземныхъ ямахъ или канавахъ; этотъ способъ особенно употребителенъ въ большихъ хозяйствахъ или въ тѣхъ случаяхъ, когда запасы велики. Такія ямы имѣютъ обыкновенно отъ 3 до 5 или 6 аршинъ глубины и бываютъ различныя формы и величины, смотря по потребности. Если онѣ выкопаны въ совершенно сухой землѣ, то клубни сберегаются въ нихъ превосходно, иногда даже лучше, чѣмъ въ подвалахъ или погребѣ. Были примѣры, что картофель сохранялся въ нихъ безъ всякой порчи въ продолженіе 30 лѣтъ. Какъ скоро яма выкопана, въ нее насыпаютъ картофель, передъ тѣмъ какъ можно лучше просушенный, закрываютъ ихъ тщательно соломою, сверхъ которой наваливаютъ слой земли, толщиною отъ одного то полутора аршина, и утаптываютъ его какъ можно плотнѣе и крѣпче. Этотъ способъ сбереженія имѣетъ впрочемъ тотъ недостатокъ, что нѣтъ возможности постоянно слѣдить за состояніемъ хранящихся въ ямѣ клубней, которые очень часто разгорячаются и загниваютъ во время зимы, какъ потому, что сырость и испаренія, выходящія изъ нихъ, не находятъ свободнаго выхода, такъ и отъ того, что ихъ трудно защитить отъ дождевой и снѣжной воды, часто проникающихъ въ ямы, не смотря на соломенную и земляную покрышку. Кромѣ того, устройство такихъ ямъ, если онѣ велики, обходится довольно дорого, потому что рытье ихъ, кладка картофеля, покрышка соломою и засыпка землею требуетъ много времени и работы. Если зимніе морозы очень сильны, то верхніе слои картофеля нерѣдко промерзаютъ; если же вслѣдъ за насыпкою клубней наступитъ теплая погода, то они легко разгорячаются и начинаютъ портиться. Поэтому хорошо оставлять въ началѣ въ земляной насыпи продушины и держать ихъ открытыми до наступленія морозовъ, чтобы дать возможность выходить чрезъ нихъ испареніямъ. Также и выниманіе изъ нихъ картофеля зимою очень затруднительно, и если вскрытая для этого яма не будетъ потомъ снова хорошо засыпана, то клубни легко могутъ промерзнуть.

Всѣ эти неудобства причиною тому, что во многихъ мѣстахъ, вмѣсто подземныхъ ямъ, употребляютъ для сбереженія картофеля кучи, въ которыхъ онъ сохраняется лучше и устройство которыхъ обходится гораздо дешевле. Для этой цѣли выбираютъ самое сухое мѣсто, вблизи двора или на открытомъ полѣ, и отмѣчаютъ кругъ въ три или четыре аршина въ поперечникѣ; потомъ устилаютъ его сухою соломою и насыпаютъ на нее слой картофеля; когда клубни достаточно просохли, ихъ складываютъ въ остроконечную

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

кучу, прикрываютъ соломою и потомъ при наступленіи зимы—землею, въ которой дѣлаютъ продушины для выхода испареній; за тѣмъ вырываютъ во кругъ кучи, на разстояніи двухъ вершковъ для стока воды, небольшую канаву, шириною отъ двѣнадцати до четырнадцати вершковъ. Въ случаѣ слишкомъ сильныхъ холодовъ, кучу обкладываютъ еще соломою или не слишкомъ соломистымъ навозомъ, и снимаютъ эту покрышку при наступленіи оттепели.

Еще лучше складывать кучи слѣдующимъ образомъ: берутъ двѣ длинныя лѣстницы, у которыхъ перекладины находятся такъ близко одна къ другой, что въ промежутки между ними не могутъ проваливаться картофельные клубни, приставляютъ ихъ одну къ другой наискосокъ, въ видѣ крыши, и укрѣпляютъ въ этомъ положеніи кольями, которые вбиваютъ въ землю по направленію длины лѣстницъ; за тѣмъ насыпаютъ около лѣстницъ съ боковъ и сверху картофель, такъ чтобы онъ образовалъ родъ вала, похожаго на кровлю и прикрываютъ его соломою, сверхъ которой набрасываютъ слой земли, сначала не слишкомъ толстый. Въ послѣдствіи, когда холода сдѣлаются сильнѣе, земляной слой дѣлаютъ толще, а въ самые сильные морозы обкладываютъ его еще древесною листвою или конскимъ навозомъ. Земля для покрышки вырывается съ боковъ кучи, вслѣдствіе чего вокругъ нея образуется небольшая канава, въ которую можетъ удобно стекать вода. На гребнѣ вала становятъ, въ нѣкоторомъ растояніи одна отъ другой, деревянныя сколоченныя изъ трехъ или четырехъ продыравленныхъ досокъ трубы. Эти трубы затыкаются соломою и открываются, когда нужно провѣтрить кучи или когда наступитъ оттепель; въ мѣстахъ, гдѣ падаетъ очень много снѣга, земляную покрышку не должно дѣлать очень толстую; въ подобныхъ случаяхъ достаточно накидать слой земли, толщиною отъ трехъ до четырехъ вершковъ; въ безснѣжныя же зимы, или въ мѣстахъ, гдѣ вообще выпадаетъ мало снѣга, земляной слой долженъ имѣть не меньше осьми вершковъ толщины, иначе картофель можетъ пострадать отъ мороза. Вмѣсто соломы еще лучше обкладавать кучи слоемъ мха, въ



два вершка толщиною, и класть его зеленью наверхъ, а корнями внизъ.

Картофельныя кучи можно также закладывать такимъ образомъ, чтобы часть ихъ находилась въ землѣ, а часть сверхъ земли. Для этого должно выкопать яму или канаву глубиною въ три четверти аршина, за нѣсколько времени до уборки картофеля съ полей, для того, чтобы дать ей хорошенько просохнуть, и выложить дно и бока ея соломою. За тѣмъ насыпаютъ въ нее картофель валомъ, наподобіе крыши, и оставляютъ его не покрытымъ до наступленія морозовъ, въ случаѣ же дождя прикрываютъ его

Вологодская областная универсальная библиотека
www.booksite.ru

соломою. Предъ началомъ холодовъ накладываютъ на кучу слой соломы толщиною по крайнѣй мѣрѣ въ три вершка, такимъ образомъ, чтобы она перегибалась чрезъ гребень вала концами внизъ, и накидываютъ потомъ землю, какъ было описано выше.

Если внимательно наблюдать за такими кучами, прикрывать ихъ во время морозовъ и снимать часть земляной покрышки съ наступленіемъ оттепелей, затыкать въ холодную погоду трубы соломою и открывать ихъ какъ скоро сдѣлается теплѣе, то картофель не промерзнетъ, не загніетъ въ нихъ и сохранится отлично до новаго посѣва, не потерявъ даже своего вкуса.

ПРИЗНАКИ ЛОШАДИНЫХЪ ЛѢТЪ ПО ЗУБАМЪ.

Вообще зубы состоятъ изъ *корня*, или части, всегда закрытой деснами, и *вѣнчика* (коронки) или части, вышедшей изъ десенъ и ясно видимой во рту. Вѣнчикъ состоитъ изъ *плоскости* или самой верхней широкой части зуба, которая служитъ для разжевыванія или растиранія пищи: на самыхъ молодыхъ зубахъ ее еще не бываетъ, но только два *края* передній и задній, а между ними углубленіе, названное *чашкою*. Когда вѣнчики противуположныхъ зубовъ, т. е. верхнихъ и нижнихъ, начнутъ касаться одинъ другаго, то образуются и плоскость, а какъ зубы начнутъ стираться, то чашки станутъ уменьшатся и наконецъ совсѣмъ исчезаютъ. Очень бѣлыя полоски, выдавшіяся выше поверхности коронки зуба, называются *эмалевыми краями*.

Взрослыя лошади имѣютъ: кобылы по 36 зубовъ, жеребцы же по 40 зубовъ, ибо у нихъ есть еще *клыки*, въ каждой челюсти по два.

Переднихъ зубовъ въ каждой челюсти по 6, а *коренныхъ* по 12; у жеребцовъ же еще по два клыка, которыми отдѣляются передніе зубы отъ коренныхъ, или бабокъ. Случается иногда, что и кобылы имѣютъ клыки, хотя и не такъ большіе, каковы бываютъ у жеребцовъ.

Къ узнанію лѣтъ служатъ обыкновенно только *передніе* зубы: средніе изъ нихъ два называются *рѣзцами*, слѣдующіе за ними, съ каждой стороны по одному, *заставками*, а выходящіе близъ заставочныхъ, также по одному, называются *угловыми* украйками.

Жеребята большею частію родятся безъ зубовъ. Чрезъ нѣсколько же дней, а иногда чрезъ недѣлю, двѣ, начинаютъ выходить у нихъ зубы молочные или рѣзцы, на третьемъ и четвертомъ мѣсяцѣ показываются заставки, а на пятомъ, шестомъ, седьмомъ и осьмомъ мѣсяцѣ выходятъ и угловые зубы или украйки; жеребенокъ имѣетъ тогда всѣ двѣнадцать переднихъ зубовъ, которые вообще называются молочными. Они вообще гораздо глаже, бѣлѣе, меньше и короче зубовъ, примѣчаемыхъ у лошадей взрослыхъ, да и сидятъ не такъ плотно одни близъ другихъ.

На этихъ молочныхъ зубахъ находятся больше или меньше глубокія ямки (чашки), которыя съ лѣтами лошади измѣняются. Внутренность этихъ ямокъ темнаго цвѣта.

Когда жеребенокъ будетъ имѣть *два года*, то на третьемъ году выпадаютъ у него изъ молочныхъ средніе два зуба какъ вверху, такъ и внизу,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

а на мѣсто ихъ выходятъ другіе зубы, навсегда уже остающіеся (конскіе). Въ продолженіе четвертаго года роняетъ жеребенокъ всѣ четыре зуба заставные (заставки), на мѣсто которыхъ выростаютъ новые; наконецъ въ продолженіе *пятаго* года перемѣняются и зубы угловые; въ это же время у жеребцовъ и мериновъ начинаютъ показываться клыки, которые впрочемъ у иныхъ показываются и раньше. Въ это время жеребенокъ уже не кажется жеребенкомъ, но имѣетъ видъ взрослой лошади.

Пятилѣтній возрастъ лошади познается по тому, что угловые зубы высоко поднимаются и передній ихъ край равенъ съ зубами молочными (средними); но онъ еще совершенно остръ, ни мало еще не стертъ и снаружи примѣтно желтоватъ, внутренній же край ихъ (задній) не ровенъ и не поровнялся еще съ плоскостью зубовъ молочныхъ среднихъ. Клыки выростаютъ столько, что коронки ихъ совсѣмъ уже вышли изъ десенъ (случается однакожъ, что они раньше и позже выходятъ или дѣлаются длиннѣе), острія краевъ ихъ совершенно цѣлы, а бороздки въ ихъ вѣнчикахъ ясно видны. Въ зубахъ угловыхъ чашки еще довольно глубоки и примѣтны, хотя и не всегда.

У *шестилѣтнихъ* лошадей плоскости переднихъ зубовъ измѣняются и это измѣненіе показываетъ лѣта лошади. Чашки среднихъ молочныхъ зубовъ большею частію изглаживаются и только остается еще углубленіе между обоими эмальными краями; а чашки заставныхъ зубовъ занимаютъ еще большое пространство, и задній край угловыхъ зубовъ дѣлается такъ длиненъ, что равняется съ плоскостію другихъ, чашки же ихъ бываютъ еще очень велики и глубоки. Края коронокъ клыковъ у жеребцовъ и мериновъ нѣсколько притупляются.

У *семилѣтнихъ* лошадей чашки на среднихъ молочныхъ зубахъ совершенно изглаживаются, а на заставныхъ примѣчаются только маленькія углубленія темнаго цвѣта, внутренній край зубовъ угловыхъ соединяется съ наружнымъ краемъ и образуетъ значительную плоскость, чрезъ что чашки становятся площе. Острія клыковъ дѣлаются тупѣе, круглѣе, а самыя бороздки ихъ площе.

По прошествіи *осьми* лѣтъ у лошади обыкновенно чашки среднихъ молочныхъ зубовъ и заставныхъ совершенно дѣлаются непримѣтными, но на угловыхъ зубахъ напротивъ того не рѣдко замѣчаются еще маленькія чашки, и эти зубы получаютъ большую плоскость и продолговато-треугольную форму.

Надобно замѣтить, что эти явленія постоянѣе бываютъ на нижнихъ зубахъ; чашки же верхнихъ зубовъ хотя въ томъ же порядкѣ умаляются, но нѣсколько позже.

Въ *девять* лѣтъ бываютъ еще примѣтны слѣды чашекъ въ угловыхъ зубахъ. Но иногда онѣ совершенно изглаживаются; плоскости всѣхъ зубовъ болѣе и болѣе сглаживаются, принимаютъ трехугольную форму, а клыки дѣлаются тупѣе и круглѣе. По прошествіи девяти лѣтъ трудно и едва ли можно съ точностію опредѣлять лѣта лошадей.

Въ *десять* лѣтъ большею частію и чашки угловыхъ зубовъ верхнихъ совершенно сглаживаются, а поверхности плоскостей зубныхъ становятся шире и измѣняются безпрестанно въ своей формѣ. Передніе зубы нижней челюсти отклоняются отъ своего прямаго положенія и постепенно съ лѣтами вѣнчики ихъ дѣлаются длиннѣе, потому что десны болѣе и болѣе отъ нихъ отдаляются къ челюстной кости.

У очень *старыхъ* лошадей и эмалевое вещество зубовъ мало по малу пропадаетъ и остается его очень мало, или и совсѣмъ не

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

бываетъ, а самые зубы становятся неодинаковой длины, даже коренные зубы бываютъ уже болѣе или менѣе стерты. У нѣкоторыхъ лошадей въ различное время зубы выпадаютъ.

Вообще выхожденіе зубовъ у лошадей отъ различныхъ обстоятельствъ измѣняется и по этому дѣлаетъ признаки по нимъ невсегда вѣрными. Кормъ разнаго свойства, мягкій или жесткій, дѣйствуетъ на зубы не одинакимъ образомъ, а потому и зубы не одинаково отъ него измѣняются; неправильное устроеніе челюстей бываетъ причиною, что верхніе зубы не касаются нижнихъ прямо, а потому они истираются не такъ, какъ то бываетъ обыкновенно, когда челюсти устроены хорошо, ибо въ такихъ случаяхъ иногда угловые зубы, или заставочные стираются прежде среднихъ молочныхъ, или зубы на одной сторонѣ челюсти стираются болѣе, нежели тѣ же самые на другой сторонѣ, а иногда непримѣтно бываетъ и никакихъ слѣдовъ ихъ стиранія.

Сверхъ того цыгане и барышники, торгующіе лошадьми, употребляютъ множество средствъ, чтобы жеребенку придать видъ лошади взрослой, а этой послѣдней видъ молодой лошади; они вырываютъ иногда всѣ зубы у жеребенка, что заставитъ скорѣе рости другіе зубы, какіе обыкновенно бываютъ у лошадей взрослыхъ; иногда же у старой лошади выпиливаютъ и прижигаютъ зубныя чашки, чтобы она казалось молодою, или подпиливаютъ зубы, чтобы они казались короче; они дѣлаютъ множество другихъ обмановъ, для открытія которыхъ требуется очень опытнаго глаза.

МѢРЫ ПРОТИВЪ СКОТСКИХЪ ПАДЕЖЕЙ.

—

Въ прошедшій разъ мы остановились на томъ, что дѣлать съ больною скотиною до прибытія врача.

Пока прибудетъ въ село, по требованію становаго пристава или окружнаго начальника, врачь, полезно употреблять противъ заразительныхъ болѣзней слѣдующія простыя средства. Больной скотинѣ не давать сухаго корма, напр. сѣна и соломы, а вмѣсто этого траву или сѣно, смоченныя, какъ сказано, теплою водою и пойло изъ воды, сваренной съ овсяною мукою или овсяною и ячною крупою, или наконецъ съ отрубями или ржаною мукою. Къ этому можно прибавлять соленые огурцы, или кислыя яблоки, измятые и наподобіе киселя приготовленные съ мукою и сывороткою. Если скотина потеряетъ жвачку, то давать соленую сельдь, а за недостаткомъ ее, взять ржаной хлѣбъ и, помочивъ его слюною здоровой скотины, давать больной. Пойло въ такомъ случаѣ давать изъ 8 частей воды съ одною частью уксуса; вмѣсто этого можно употреблять также по бутылкѣ сыворотки или обыкновенный квасъ. Когда замѣченъ будетъ въ скотинѣ жаръ, то полезно употребить квасную гущу, или пивныя дрожди съ селитрою или съ солью; для этого, взявъ дрождей или квасной гущи полведра, положить горсть или двѣ селитры или соли, смѣшать и давать по обыкновенному ковшу, три, четыре и пять разъ въ день. Съ этою же цѣлью можно употреблять и огуречный разсолъ, и даже самые огурцы, столченные въ жидкую кашицу. Если у скотины запоръ, то взять конопляннаго или льнянаго масла полбутылки, взболтать его съ равнымъ количествомъ ячнаго отвара и дать въ одинъ разъ, а если часа черезъ два не подѣйствуетъ, повторить пріемъ. Когда у животнаго поносъ, то давать ему одно питье изъ воды и муки, но безъ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

соли. Если у скотины покажутся прыщи во рту или на языкѣ, то обтирать ихъ уксусомъ, смѣшаннымъ съ медомъ, или водкою, смѣшанною съ соленою водою по равной части. Отираніе можно дѣлать тряпицею, навязанною на палочку. Если опухнутъ или онѣмѣютъ ноги, то на этихъ мѣстахъ дѣлать разрѣзы и, по истеченіи крови, омывать ихъ уксусомъ съ виномъ, а трещины у копытъ мазать саломъ или масломъ коровьимъ или постнымъ, смѣшавъ съ нимъ нѣсколько скапидара. Когда опухоль покажется на шеѣ или между ногами, то къ ней тотчасъ прикладывать печеный лукъ, смѣшанный по равнымъ частямъ съ чеснокомъ и горчицею или хрѣномъ, чтобы скорѣе нарвало; созрѣвшій нарывъ проколоть шиломъ или иглою и прикладывать къ нему сало или масло съ скапидаромъ.

Сибирская язва иногда отъ животныхъ переходитъ и къ людямъ, а поэтому при ней требуется еще болѣе осторожности. Сообщенія не только между животными здоровыми и больными, но и между людьми, ухаживающими за тѣми и другими должно быть прекращено. Молоко, сыръ, масло и проч. отъ больныхъ язвою животныхъ особенно вредны, а потому ихъ слѣдуетъ выливать въ особыя мѣста. Павшій скотъ зарывать аршина на три въ землю въ отдаленныхъ мѣстахъ и кожи на паломъ скотѣ всѣ изрѣзать, такъ чтобы никому не пришла охота вырывать трупы изъ земли для сдиранія кожъ. Прислуга, ухаживающая за животными, больными сибирской язвой, должна остерегаться, чтобы влага отъ скотины не попала въ лице или на глаза. При уходѣ, руки нужно мазать жиромъ или жирнымъ масломъ. Тѣ, которые имѣютъ прыщи или царапины на лицѣ или на рукахъ, не должны прикасаться къ скоту, зараженному сибирскою язвою. Если бы попала влага отъ животнаго на какія нибудь нѣжныя части тѣла, то, не теряя времени, ихъ нужно обмыть растворомъ соли, щелокомъ, известковою водою или уксусомъ, что случится.

Всѣ сказанныя средства, если ихъ употреблять во-время, могутъ или остановить болѣзнь или задержать ее до пріѣзда врача. Когда же онъ прибудетъ, тогда слѣдуетъ строго исполнять его совѣты, которые основываются на наукѣ, а не на бредняхъ, какъ у деревенскихъ колдуновъ да знахарей, а потому и заслуживаютъ того, чтобы ихъ слушаться. Знахарей же всегда полезнѣе оставить въ сторонѣ и не ставить на одну доску съ врачами, которые не даромъ же учились своему дѣлу. „Наука — свѣтъ“ — это всякій знаетъ. Растеніе повертывается въ ту сторону, откуда свѣтитъ свѣтъ. У человѣка должно лежать сердце къ той сторонѣ, откуда свѣтитъ наука. Рядомъ съ наукой стоитъ законъ. Законъ, какъ и наука, хлопочетъ объ одномъ, чтобы человѣку облегчить тягости жизни и предохранить его отъ разныхъ бѣдъ и горя. А если законъ и наука имѣютъ эту цѣль, то можно ли не уважать ихъ и честно ли не исполнять ихъ приказанія и совѣты? Не честно, не совѣстливо! Противъ скотскихъ падежей, также какъ и противъ всякаго зла, ратуютъ постоянно законъ и наука. Слѣдовательно не честно, не совѣстливо было бы не исполнять правилъ закона или совѣтовъ врача противъ повальныхъ болѣзней.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Мая 18 дня 1860 года. Цензоръ *В. Бекетовъ.*

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru